

Informazioni pratiche gestione processionaria del pino

La presente nota al fine di fornire qualche utile riferimento per la gestione delle larve di processionaria del pino che potrebbero essere rilevate presso aree verdi pubbliche del comune di Scandicci.

La processionaria del pino una volta uscita dal nido invernale compie un tragitto che la porterà ad interrarsi. In questa fase, a causa dei peli urticanti di cui è ricoperta, può causare fastidi a chi ne entra in contatto.

Il Comune di Scandicci, come tutti gli anni, ha preventivato un servizio di taglio dei nidi invernali rilevati sulle piante di pino e di trappole a cattura negli alberi più difficilmente raggiungibili per le operazioni di taglio.

Purtroppo nel caso in cui, anche a seguito di queste attività, si dovesse rilevare attività di processionarie in transito sul terreno le azioni da intraprendere sono le seguenti:

1. Effettuare segnalazione telefonica all'Ufficio Ambiente del Comune **Tel. 0557591245/288**
2. Tenere lontani i bambini e i cani dall'area di rilevamento in attesa dell'intervento del Comune che provvederà alla messa in sicurezza attraverso la rimozione delle larve a terra da parte degli operatori di Alia spa.

In **Allegato 01**, **Allegato 02** ed **Allegato 03** sono riportati alcuni estratti del documento Redatto dal Servizio Fitosanitario Regionale nei quali possono leggere utili consigli relativi alla gestione dell'infestante in oggetto.

Il documento integrale è scaricabile presso il seguente indirizzo:

<http://www.regione.toscana.it/documents/10180/12352035/Processionaria+del+pino.pdf>.



Nido invernale



Tipica formazione in fila delle larve

ALLEGATO 01

Cosa fare e cosa non fare

	Non avvicinarsi, non sostare e non stendere la biancheria in prossimità di piante infestate.
	Lavare abbondantemente con dei guanti frutta ed ortaggi provenienti da campi vicini a zone infestate da processionaria del pino
	Non tentare con mezzi artigianali di distruggere i nidi, in quanto il primo effetto che si ottiene è quello di favorire la diffusione nell'ambiente dei peli urticanti
	In caso di contatti accidentali con larve o nidi evitare di grattarsi e lavarsi con acqua corrente e sapone tutto il corpo, (testa compresa). Lavare i panni a temperatura non inferiore a 60°C senza maneggiarli a mani nude.
	A fine inverno-inizio primavera, quando si possono osservare con particolare frequenza le processioni di larve lungo i tronchi o sul terreno, non raccogliere i bruchi senza protezioni e mezzi adeguati
	Non distribuire sulle larve o sui nidi insetticidi generici
	Per ogni informazione contattare il Servizio Fitosanitario

ALLEGATO 02



Cosa fare in caso di contatto con i peli urticanti

La gravità delle reazioni allergiche che si manifestano in persone o animali a sangue caldo a causa della processionaria, varia sensibilmente in relazione: alla durata, alla quantità ed al tipo di contatto con i peli urticanti, oltre che alla sensibilità specifica del soggetto coinvolto.

Di seguito si indicano gli effetti e le precauzioni da adottare nel caso in cui il contatto con i peli urticanti sia avvenuto:

Pelle

Sintomi: *comparsa dopo breve tempo all'esposizione di aree arrossate con forte sensazione di prurito, principalmente sulle parti del corpo scoperte e in punti con sudorazione abbondante.*

Consigli:

- a) lavare abbondantemente il corpo (capelli inclusi) con acqua e sapone*
- b) manipolare i vestiti con guanti e lavarli anch'essi avendo cura di utilizzare acqua a temperatura elevata*
- c) sulle parti che hanno toccato larve e nidi utilizzare eventualmente strisce di scotch come un mezzo depilante per asportare parte dei peli ancorati alla pelle*
- d) utilizzare sulle parti arrossate una pomata antistaminica per lenire il fastidio*

Occhi

Sintomi: *dopo poche ore comparsa di forti congiuntiviti*

Consigli: *effettuare un rapido controllo medico*

Inalazione

Sintomi: *difficoltà a deglutire che possono poi essere seguite da broncospasmi*

Consigli: *effettuare un rapido controllo medico*

Ingestione

Sintomi: *l'infiammazione delle mucose della bocca si accompagna a ipersalivazione e nel caso di interessamento dei primi tratti intestinali possono comparire dolori addominali*

Consigli: *effettuare un rapido controllo medico*

ALLEGATO 03